

SEMENTI PER PRATO

PER LE TRASEMINE



naturalgreen

Blend mono-specie strisciante di *Lolium* perenne nelle varietà stolonifere "CONFIDENCE" e "STOLAWN". Sementi conciate a secco con inoculo micorrizico integrato. Adatto per trasemine di tappeti erbosi scuri sia in area ricreativa sia sportiva. Adatto anche per nuove semine con risultati immediati. Ideale per inerbire aree residenziali con esposizione in pieno sole. Il miscuglio è autorigenerante e in poche settimane dalla semina è in grado di formare una cotica fitta e densa con colorazione verde scura. Si consiglia di insediarlo a fine estate, in modo che il Loietto strisciante sia in grado, dopo l'inverno, di sviluppare gli stoloni superficiali.

Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
70%	Loietto perenne stolonifero Confidence
30%	Loietto perenne stolonifero Stolawn

Composizione Concia:	Contenuto in micorrize (<i>Glomus spp.</i>): 0,5% Contenuto in batteri della rizosfera: (<i>Pseudomonas spp.</i>) 3×10^9 UFC/g Contenuto in trichoderma: (<i>Trichoderma spp.</i>) 2×10^5 UFC/g
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consigli Tecnici

Terreni	Profondo, drenante di medio impasto.
Periodo di semina	Agosto-settembre-ottobre e marzo-aprile-maggio
Dosaggio Consigliato	Da 20-30 gr/mq. Si consiglia di non esagerare con il dosaggio, perché altrimenti si riduce la tendenza di emettere stoloni superficiali da parte di "CONFIDENCE" e di "STOLAWN", a causa dell'aumento della competizione tra le stesse piante o, nel caso di trasemina, con le essenze presenti. La germinazione può impiegare dai 4 ai 10 gg in relazione alla temperatura del terreno (temperatura del suolo richiesta superiore ai 10°C)
Taglio	Eeguire il primo taglio quando l'erba raggiunge i 6 cm e durante la gestione annuale all'ombra non scendere sotto i 4-4,5 cm; in aree miste sole/ombra tenere un'altezza di 3,5-4 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente
Nutrizione	Concimazione fosfatica alla semina e poi optare per un rapporto N/K 2:1 con non oltre 30 unità azotate mq/annue. In situazione di sole/ombra non eccedere le 25 Unità di Azoto mq/annue
Irrigazione	Alla semina tenere il letto di semina costantemente umido per non fermare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 6 mm/giorno e incrementare a 10 mm/giorno in piena ombra da caducifoglie.
Fitostimolazione	Programmare 4 trattamenti biostimolanti tra luglio e agosto per aumentare la tolleranza all'ombra e agli stress ambientali estivi
Rigenerazione	Usare lo stesso miscuglio per la consueta rigenerazione di fine estate o di fine inverno, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro.



Scatola da 1 Kg
Sacco da 7 Kg