

SEMENTI PER PRATO

PER ZONE SOLEGGIATE



Miscuglio innovativo di cultivar striscianti di Festuca arundinacea rizomatose, "FLAME" e "RHIZING STAR" e Poa pratense tutte conciate con inoculo micorrizico integrato. Ideale per aree esposte a sud o leggermente ombreggiate. Tessitura medio-fine e a colorazione scura. Tappeto erboso costituito da cultivar di origine americana. Si consiglia d'insediare la miscela a fine estate in modo che la Festuca arundinacea sia in grado, dopo l'inverno, di sviluppare i rizomi sotterranei a piena maturità. Si presenta molto denso, fitto e uniforme, di colorazione scura.

Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
60%	Festuca arundinacea Flame
35%	Festuca arundinacea Rhizing Star
5%	Poa pratense Jackpot

Composizione Concia:

Contenuto in micorrize (*Glomus spp.*): 0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera: (*Pseudomonas spp.*) 3×10^9 UFC/g
Contenuto in trichoderma: (*Trichoderma spp.*) 2×10^5 UFC/g

Consigli Tecnici

Terreni	Profondo, drenante di medio impasto.
Periodo di semina	Agosto-settembre-ottobre e febbraio-marzo-aprile-maggio
Dosaggio Consigliato	Da 30-35 gr/mq. Si consiglia di non esagerare con il dosaggio, perché altrimenti si riduce la tendenza di emettere rizomi da parte di "FLAME" e di "RHIZING STAR", a causa dell'aumento della competizione della Poa pratensis. La germinazione può impiegare dai 4 ai 10gg in relazione alla temperatura del terreno (temperatura del suolo richiesta superiore ai 12°C)
Taglio	Eeguire il primo taglio quando l'erba raggiunge i 6 cm e durante la gestione annuale all'ombra non scendere sotto i 5,5-6 cm; in aree miste sole/ombra tenere l'altezza di rasatura sopra i 5 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente
Nutrizione	Concimazione fosfatica alla semina e poi optare per un rapporto N/K 1:1 con non oltre 25 Unità azotate mq/annue. In situazione di sole/ombra non eccedere le 20-25 Unità di Azoto mq/annue
Irrigazione	Alla semina tenere il letto di semina costantemente umido per non fermare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 6 mm/giorno e incrementare a 10 mm/giorno in piena ombra da caducifoglie.
Fitostimolazione	Programmare 3-4 trattamenti biostimolanti tra luglio e agosto per aumentare la tolleranza all'ombra e agli stress ambientali estivi
Rigenerazione	Usare lo stesso miscuglio per la consueta rigenerazione di fine estate o di fine inverno, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro.



Scatola da 1 Kg
Sacco da 7 Kg