

ROYAL GOLF

Miscuglio scuro di tessitura fine per giardini privati in condizioni miste ombra/sole in aree a clima temperato-continentale. Miscela ricreativa/ornamentale/sportiva di grande interesse in svariate situazioni, dal parco pubblico al Campo da Golf. Tappeto erboso costituito da cultivar di origine americana caratterizzate da colorazione verde intensa anche nella stagione fredda, grazie alla presenza di Festuca rubra selezionata. A piena maturità, si presenta molto denso, fine e uniforme. Tollerante al Mal Bianco, Filo Rosso, Dollar spot e Microdochium.



Sacco da 10 Kg

Composizione:

| % in peso | Specie & Cultivar |
|-----------|--------------------------------------|
| 40% | Loietto perenne Thrive/Benchmark |
| 20% | Loietto perenne Spyglass/Galley Star |
| 20% | Festuca rubra Heidrun |
| 20% | Poa pratense Answer |

Consigli Tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terreno | profondo, drenante, di medio impasto, ma anche argilloso e/o sciolto, con pH che può spaziare dall'alcalinità fino alla sub-acidità |
| Periodo di semina | da Febbraio fino ad inizio Novembre (saltando i mesi di massimo caldo estivo). Il miscuglio impiega da 4 a 10 gg a germinare in considerazione della temperatura dei terreni (temperatura del suolo superiore ai 10°C) |
| Dosaggio Consigliato | 30-35 gr/mq. Le dosi massime sono consigliate in caso di semine tardive e/o non perfetta lavorazione del letto di semina. |
| Taglio | eseguire il primo taglio quando il miscuglio raggiunge gli 8-10 cm, poi, in gestione all'ombra non scendere sotto i 6 cm. In aree miste sole/ombra mantenere il tappeto a 4 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente con un unico sfalcio |
| Nutrizione | concimazione fosfatica alla semina con Biostart P 12.20.15. In seguito all'ombra gestire la nutrizione con un rapporto N/K 1:2 con circa 20 unità azotate mq/annue. In situazione di sole/ombra aumentare la frazione azotata arrivando a 25 unità di Azoto mq/annue |
| Irrigazione | all'impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 6 mm/giorno, incrementando a 10 mm/giorno in condizioni di piena ombra da caducifoglie |
| Fitostimolazione | programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza all'ombra e agli stress ambientali estivi (stress biotici ed abiotici) |
| Rigenerazione | impiegare lo stesso miscuglio per la rigenerazione di fine estate e/o di uscita dall'inverno, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro e successiva distribuzione di circa 40-50 gr/mq di Royal Golf o Royal Blend per rinfoltire la vegetazione. Concimare poi con Biostart P 12.20.15 alle indicazioni d'etichetta |

Epoca di semina

