

# ROYAL BLEND

Blend di Loietti di tessitura fine di origine americana di colorazione verde scura, specifico per trasemine. Perfetto per rigenerare tutti i miscugli della linea Mastergreen e le miscele a colorazione intensa in genere. Ideale per aree sportive o ricreative in pieno sole e/o mezz'ombra. A piena maturità, si presenta molto denso, fine, uniforme e resistente al calpestio e al traffico. Alto livello di endofizzazione naturale. Tollerante nei confronti di Mal Bianco, Filo Rosso, Dollar Spot, Gray Leaf Spot e Microdochium spp.



Sacco da 10 Kg

## Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
50%	Loietto perenne Thrive
25%	Loietto perenne Galley Star/Allstarter
25%	Loietto perenne Benchmark

## Consigli Tecnici

<b>Terreno</b>	tendente al sciolto, drenante e profondo
<b>Periodo di semina</b>	da Marzo a Novembre. Tempi di germinazione da 3 a 10 gg in funzione della temperatura del terreno (temperatura del suolo superiore ai 10°C)
<b>Dosaggio Consigliato</b>	30-40 gr/mq in situazione classiche per arrivare fino ad 80-100 gr/mq in trasemine tecniche. Le dosi più alte sono sempre consigliate in caso di trasemina con elevate temperature e/o non perfetta lavorazione del letto di semina
<b>Taglio</b>	dopo la trasemina effettuare la prima rasatura quando l'erba raggiunge i 6-8 cm e non asportare mai più del 30% ad ogni taglio. Dopo 40 gg dalla trasemina, se possibile, ridurre la frequenza di taglio a 2 volte la settimana
<b>Nutrizione</b>	concimazione fosfatica con Biostart P 12-20-15 alla semina e poi pianificare 4-6 concimazioni annue con almeno 30 unità di Azoto mq/annui per salire a 40 unità di Azoto mq/annui in caso di verde sportivo. Durante la gestione annuale evitare fertilizzanti a base di Fosforo per evitare la potenziale proliferazione della Poa annua
<b>Irrigazione</b>	all'impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 7 mm d'acqua ogni giorno. Se possibile programmare nei mesi di luglio e agosto un'irrigazione termica da 1-2 mm ogni giorno intorno alle 11:00 (syringing)
<b>Fitostimolazione</b>	programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza delle piante agli stress idrici ed evitare la riduzione dell'apparato radicale.
<b>Rigenerazione</b>	per le trasemine in ambito sportivo è importante utilizzare macchine specifiche e professionali in grado di interrare la semente anche su sodo in modo che questa possa nascere con regolarità e uniformità. Eseguire un leggero verticut con asporto del feltro.

## Epoca di semina

