BOTTOS

EVOLUZIONE VERDE DAL 1848

2023

GIUGNO

CALENDARIO VERDE

PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

Che cosa occorre fare al prato a giugno?

- **Alzare il taglio** di circa 1-1,5 cm rispetto a quello che normalmente si esegue durante le stagioni ad alta intensità di crescita vegetativa
- **Ridurre le concimazioni azotate** a pronto effetto, prediligendo i fertilizzanti con azoto controllato e con un'**alta presenza di potassio**
- **Allungare i cicli d'irrigazione** con quantità abbondanti (fino a10 litri/m^2 nei mesi di luglio e agosto, o durante le fasi anticicloniche e utilizzare agenti umettanti per la conservazione dell'acqua come **WATER PLUS**
- **Intervenire con Biostimolanti** a base di Acidi umici e fulvici (**VIGOR LIQUID**) e/o con aminoacidi (**ALWAYS**) che contribuiscono a migliorare il metabolismo della pianta sotto stress riducendo gli effetti negativi, soprattutto quelli dei radicali liberi.

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

FLY

Inoculo micorrizico integrato contenente Beauveria, Metharizum e Lecanicillium. Trattamento liquido preventivo con effetto barriera contro gli insetti dannosi per il prato.
Dosaggio: Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d'acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A
ALWAYS (RADICALE)

FIGHTER

Concime organico azotato fluido a base di estratti di lieviti contiene alghe brune. Sviluppo di batteri utili contro gli agenti patogeni
Dosaggio: Fogliare: 25-30 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d'acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A
PRE STRESS

CONCIMI GRANULARI E LIQUIDI

SUMMER K 10-0-30

Antistress estivo ed invernale, conferisce alla vegetazione maggiore tolleranza agli stress termici e idrici. Evita la lisciviazione del potassio
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-40 g/mq

PRO LIFE 10-5-15 + 2 MgO + 0,5 Fe + Mn + Zn

Concimazione naturale antistress a favore del risparmio idrico e nutrizionale con acidi umici e fulvici da effettuarsi prima dei caldi estivi e dei freddi invernali, per irrobustire in modo naturale il tappeto erboso. Effetto ammendante.
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 20-35 g/mq

NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO

Azione anti-stress, ripristino della biofertilità, irrobustimento e fascicolazione radicale.
PRIVO DI CATTIVI ODORI
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 40-100 g/mq

SVILUPPO RADICALE

MYKO POWER

Inoculo micorrizico integrato per il rispetto della natura e il basso impatto ambientale. Miglioratore dei substrati, facilitatore della manutenzione, aiuto per le piante
Dosaggio: Radicale, 20-40 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d'acqua

Si-STRONG

Bioinduttore a base di Silicio e Potassio. Azione cicatrizzante sulle foglie. Evita l'accumulo di sostanze dannose all'interno delle superfici fogliari e dei frutti.
Dosaggio: Fogliare: 60-120 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d'acqua
Radicale: 200 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d'acqua

SEMINE TARDIVE

In caso di **semine tardive** si consiglia l'utilizzo di sementi conciate: **ROYAL BLUE PLUS, ROYAL SHADE PLUS E ROYAL STRONG PLUS**
Molto importante la gestione dell'irrigazione nelle prime fasi di germinazione. L'obiettivo è quello di mantenere costantemente il terreno umido ma non zuppo.

Per articoli informativi e per scaricare le schede tecniche visita il nostro sito www.bottos1848.com